

# ÉCHELLE DE DOULEUR AIGUË CANINE

HÔPITAL D'ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE DE L'UNIVERSITÉ COLORADO

SCORE DE DOULEUR POUR LES CHIENS

PSYCHOLOGIQUE ET COMPORTEMENTAL

REPONSE A LA PALPATION

LA TENSION DU CORPS

0



- Confortable au repos
- Heureux, content
- La blessure ou la plaie ne le dérange pas
- Intéressés et curieux de l'environnement

- Pas de réaction à la palpation de la blessure ou de la plaie ou à toute autre parties du corps

MINIMAL

0

1



- Légèrement instable ou agité
- Distrait facilement par les environs

- Réagit à la palpation de la plaie, de la blessure ou à toute autre partie du corps en regardant autour de lui, en fléchissant ou en pleurnichant

DOUX

1

2



- A l'air mal à l'aise au repos
- Peut pleurnicher ou pleurer et peut lécher ou frotter la blessure ou la plaie lorsqu'il est laissé sans surveillance
- Oreilles tombantes, expression faciale inquiète (sourcils arqués, yeux qui pètent)
- Réticent à répondre quand on l'attire
- Pas désireux d'interagir avec les gens ou les environs, regardera autour de lui pour voir ce qui se passe

- Sursaute, pleure ou gémissent à la palpation et s'éloigne

MODERER

Réévaluer le plan analgésique

2

3



- Troublé, en pleurs, gémissant, mordant ou en mâchant une plaie sans surveillance
- Protège la blessure ou la plaie en modifiant la répartition du poids (c.-à-d., boitant, changement de la position du corps)
- Peut être réticent à déplacer tout ou une partie du corps.


- Des distinctions subtile (yeux changeants ou fréquence respiratoire accrue) si le chien a trop de douleurs pour bouger, il reste stoïque

MODERER

Réévaluer le plan analgésique

3

4



- Constamment en train de gémir ou grogner quand il est sans surveillance
- Peut mordre ou mâcher à la blessure, mais peu susceptible de bouger
- Potentiellement ne répond pas aux environs
- Difficile de le distraire de la douleur

- Des grognements à la palpation non douloureuse (craindre que la douleur puisse être aggravée à l'effleurement)

MODERE A SEVERE

Peut être rigide pour éviter un mouvement douloureux

Réévaluer le plan analgésique

4

Réévaluer la gestion de la douleur de l'animal de compagnie échoue dans cette gamme